L-Тироксин Берлин-Хеми

левотироксин натрия

50 125 150 75 100

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
БЕЗ ЛАКТОЗЫ*

В разных дозах без лактозы!*



RU-LTh-05-2023-v1-print Одобрено: июнь 2023

Краткая информация по медицинскому применению препаратов L-Тироксин 50/75/100/125/150 Берлин-Хеми. Показания: гипотиреоз; зутиреоидный зоб; в качестве заместительной терапии и для профилактики рецидива зоба после оперативных вмешательств на щитовидной железе; в качестве супрессивной и заместительной терапии при злокачественных новообразованиях щитовидной железы, в основном после оперативного лечения; диффузный токсический зоб: после достижения зутиреоидного состояния антитиреоидными средствами (в виде комбинированной или монотерапии); в качестве диагностического средства при проведении теста тиреоидной супрессии. **Режим дозирования:** суточная доза определяется индивидуально в зависимости от показаний, клинического состояния пациента и данных лабораторного обследования. Суточную дозу левотироксина натрия принимают внутрь утром натощак, по крайней мере за 30 минут до приема пищи, запивая таблетку небольшим количеством жидкости (полстакана воды) и не разжевывая. При проведении заместительной терапии гипотиреоза у пациентов моложе 55 лет при отсутствии сердечно-сосудистых заболеваний левотироксин натрия применяют в суточной дозе 1,6-1,8 мкг на 1 кг массы тела; у пациентов старше 55 лет или с сердечно-сосудистыми заболеваниями – 0,9 мкг на 1 кг массы тела. Грудным детям и детям до 3 лет суточную дозу левотироксина натрия дают в один прием за 30 минут до первого кормления. Таблетку растворяют в воде (10-15 мл) до тонкой взвеси, которую готовят непосредственно перед приемом препарата и дают запивать дополнительно небольшим количеством жидкости (5-10 мл). У пациентов с тяжелым длительно существующим гипотиреозом лечение следует начинать с особой осторожностью, с малых доз – 12,5 мкг/сут, дозу увеличивают до поддерживающей через более продолжительные интервалы времени – на 12,5 мкг каждые 2 недели, и чаще определяют концентрацию ТТГ в крови. При гипотиреозе левотироксин натрия принимают, как правило, в течение всей жизни. При тиреотоксикозе левотироксин натрия применяют в комплексной терапии с антити-реоидными препаратами после достижения зутиреоидного состояния. Во всех случаях длительность лечения препаратом определяет врач. Для точного дозирования необходимо использовать наиболее подходящую дозировку левотироксина натрия. Таблетку можно разделить на две равные части. **Противопоказания:** гиперчувствительность к левотироксину натрия и/или любому из вспомогательных веществ препарата; нелеченый тиреотоксикоз; нелеченная недостаточность надпочечников; нелеченная гипофизарная недостаточность; применение в период беременности в комбинации с антитиреоидными средствами. Не следует начинать лечение препаратом при наличии острого инфаркта миокарда, острого миокардита, острого панкардита. С осторожностью следует назначать препарат при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: ИБС (атеросклероз, стенокардия, инфаркт миокарда в анамнезе), артериальной гипертензии, аритмии; при сахарном диабете, тяжелом длительно существующем гипотиреозе, синдроме мальабсорбции (может потребоваться коррекция дозы), у пациентов с предрасположенностью к психотическим реакциям. **Побочные действия:** при правильном применении препаратов L-Тироксин Берлин-Хеми под контролем врача побочные эффекты не наблюдаются. Были зарегистрированы случаи аллергических реакций в виде ангионевротического отека.
Условия отпуска: по рецепту.


* *Подробная информация содержится в инструкциях по медицинскому применению препаратов L-Тироксин 50 Берлин-Хеми П N008963-100423, L-Тироксин 75 Берлин-Хеми ЛСР-001294/08-100523, L-Тироксин 100 Берлин-Хеми П N008964-160523, L-Тироксин 125 Берлин-Хеми ЛСР-001807/08-100523, L-Тироксин 150 Берлин-Хеми ЛСР-001484/08-150523.*

БЕРЛИН-ХЕМИ МЕНАРИНИ

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"
123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, БЦ "Башня на Набережной", блок Б.
Тел.:(495) 785-01-00, факс: (495) 785-01-01
http://www.berlin-chemie.ru
Информация для специалистов здравоохранения.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Клиника высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова

ЭНДОМИР



23 сентября 2023 год

ЧУВСТВО КОМА В ГОРЛЕ

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Клиника высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова, СПбГУ,
г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154,
2 этаж, голубой зал

9:00 – 10:00	Встреча и регистрация участников	
10:00 – 10:10	Вступительное слово. Ком в горле под прицелом мнений различных специалистов.	**Куликова Елена Александровна**, эндокринолог, заведующая поликлиническим отделением эндокринологии и эндокринной хирургии КВМТ им. Н. И. Пирогова СПбГУ, директор фонда Эндомир, к.м.н.
10:10 – 10:30	Узлы и неузловые образования щитовидной железы.	**Реброва Дина Владимировна**, эндокринолог, заведующая кафедрой эндокринологии и эндокринной хирургии Северо-Западной высшей школы, к.м.н.
10:30 – 11:00	Современные подходы к определению объема оперативного вмешательства и послеоперационному ведению пациентов с опухолями щитовидной железы	**Слепцов Илья Валерьевич**, эндокринолог, хирург-эндокринолог, главный специалист по эндокринологии и эндокринной хирургии КВМТ им. Н. И. Пирогова СПбГУ
11:00 – 11:30	Выявление и лечение доброкачественных узлов щитовидной железы. Техника спиртовой склеродеструкции.	**Пушкарук Александр Александрович,** хирург-эндокринолог отделения эндокринологии и эндокринной хирургии КВМТ им. Н. И. Пирогова СПбГУ
11:30 – 11:45	Тиреоидиты: вопросы дифференциальной диагностики.	**Русаков Владимир Федорович**, ведущий эндокринолог отделения эндокринологии и эндокринной хирургии КВМТ им. Н. И. Пирогова СПбГУ, к.м.н.
12:00 – 12:20	Нарушение голоса после операции на щитовидной железе. Причины, методы диагностики и лечение.	**Готовяхина Татьяна Васильевна** отоларинголог-фониатр, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи Минздрава РФ, к.м.н.
12:20 – 12:40	Интраоперационный нейромониторинг. Показания и эффективность.	**Макарьин Виктор Алексеевич** хирург-эндокринолог отделения эндокринологии и эндокринной хирургии ЦВМТ СПБГУ, к.м.н.
12:20 – 12:40	Чувство кома в горле: взгляд гастроэнтеролога. Вопросы дифференциальной диагностики.	**Сас Евгений Иванович**, гастроэнтеролог-нутрициолог, д.м.н.
12:40 – 13:00	Психосоматика эндокринных заболеваний. Техники управления тревожным состоянием.	**Буренкова Елена Валентиновна** танцевально-двигательный терапевт, доцент, заведующая отделением танцевально-двигательной психотерапии НОЧУ ДПО «Институт практической психологии и психоанализа», к.п.н.
13:30 - 13:40	Обсуждение и ответы на вопросы	
13:40 – 14:10	Кофе - брейк	
14:10 – 16:10	**Тренинг Ресурс тела:** восстановление через движение (предварительная запись)	**Буренкова Елена Валентиновна** танцевально-двигательный терапевт, доцент, заведующая отделением танцевально-двигательной психотерапии НОЧУ ДПО «Институт практической психологии и психоанализа», к.п.н.
14:10 – 16:10	**Мастер-класс:** по УЗИ щитовидной железы и ТАБ (предварительная запись)	**Пушкарук Александр Александрович**, хирург-эндокринолог отделения эндокринологии и эндокринной хирургии КВМТ им. Н. И. Пирогова СПбГУ, **Реброва Дина Владимировна**, эндокринолог, заведующая кафедрой эндокринологии и эндокринной хирургии Северо-Западной высшей школы, к.м.н.

Присоединиться к конференции можно онлайн и очно

https://forum-med.online/conf_end_230923

Организаторы:
Фонд поддержки и развития эндокринологии и эндокринной хирургии Эндомир; ООО «Балтика»; Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова, СПбГУ; Северо-Западный центр эндокринологии и эндокринной хирургии.